Тайгециклин — новое оружие в борьбе с тяжелыми инфекциями

Лечение осложненных бактериальных инфекций, прежде всего госпитальных, остается серьезной проблемой для систем здравоохранения во всем мире в связи с ростом распространенности множественной лекарственной устойчивости микроорганизмов — метициллинрезистентного стафилококка (MRSA), ванкомицинрезистентного энтерококка (VRE), *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella pneumoniae*, энтеробактерий, продуцирующих карбапенемазы и β -лактамазы расширенного спектра (БЛРС), и др. Инфекции, вызванные мультирезистентными микроорганизмами, ассоциируются с более высокой заболеваемостью и смертностью, увеличивают продолжительность госпитализации, а следовательно, и затраты на лечение. К сожалению, проблема устойчивости к антибиотикам не только не теряет актуальности, но и приобретает все более угрожающий характер, поскольку темпы распространения резистентности явно опережают возможности разработки новых antimicrobных препаратов (АМП). И если для преодоления устойчивости грамположительных бактерий за последние 10 лет было предложено несколько новых АМП (линезолид, даптомицин, цефтобипрол), то ситуация с решением проблемы резистентности грамотрицательных микроорганизмов на сегодняшний день менее оптимистична. Серьезную обеспокоенность вызывают сообщения о появлении устойчивости к карбапенемам у штаммов *Klebsiella pneumoniae* и других видов энтеробактерий, а также стремительное распространение карбапенемазопродуцирующих штаммов неферментирующих грамотрицательных бактерий. Пожалуй, единственным из недавно одобренных АМП, обладающим активностью не только против резистентных грамположительных, но и грамотрицательных возбудителей, является тайгециклин — первый и единственный представитель нового класса антибиотиков — глицилциклинов.

Спектр активности тайгециклина

Тайгециклин обладает широким спектром противомикробной активности, который включает многие грамположительные (*Enterococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., в том числе *Streptococcus pneumoniae*), грамотрицательные (*Aeromonas* spp., *Haemophilus* spp., *Moraxella catarrhalis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Acinetobacter* spp., *Citrobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Serratia* spp.) и анаэробные бактерии (*Bacteroides fragilis*, *Bacteroides* spp., *Clostridium perfringens*, *Peptostreptococcus* spp., *Porphyromonas* spp., *Prevotella* spp.), в том числе штаммы, резистентные к другим классам АМП, а также атипичные микроорганизмы (*Legionella pneumophila*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, микобактерии). Тайгециклин активен против таких проблемных микроорганизмов, как MRSA, VRE, пенициллинрезистентный *S. pneumoniae* (PRP), энтеробактерии, продуцирующие БЛРС.

Примечательно, что против тайгециклина бессильно большинство распространенных механизмов антибиотикорезистентности микроорганизмов, таких как защита рибосом, модификация мишени, эффлюкс, нарушение проницаемости внешней структур микробной клетки, ферментативная инактивация. Таким образом, к тайгециклину не развивается перекрестная или ассоциированная с другими классами АМП резистентность. Тайгециклин может сохранять активность даже против штаммов *Acinetobacter baumannii* и *Enterobacteriaceae*, продуцирующих карбапенемазы и, соответственно, устойчивых к карбапенемам. Наконец, очень важно, что на сегодняшний день нет оснований полагать, что ситуация может в ближайшем будущем измениться в худшую сторону. Как показало эпидемиологическое исследование TEST, в котором за период с 2004 по 2007 г. в 24 странах Европы было протестировано 24 748 изолятов наиболее распространенных грамотрицательных и грамположительных возбудителей, наиболее активными препаратами в отношении энтеробактерий и *Acinetobacter* spp., включая полирезистентные штаммы, были карбапенемы и тайгециклин, в отношении грамположительных возбудителей — тайгециклин, ванкомицин и линезолид. За 4-летний период наблюдения у изученных штаммов не было выявлено повышения значений МПК тайгециклина, в то время как такое явление было отмечено для ряда других АМП. Таким образом, данные, полученные в Европе в течение трех лет после внедрения тайгециклина в клиническую практику, свидетельствуют о том, что клиническое применение данного препарата не сопровождается распространением резистентности к нему бактериальных возбудителей.

Следует отметить, что тайгециклин обладает целым рядом характеристик, способствующих его высокой эффективности при бактериостатическом характере действия. Преимуществами тайгециклина являются хорошее распределение в организме, высокое проникновение в ткани и жидкости, в частности в легкие, кожу,

перитонеальную жидкость, желчь, кишечник, сердце, печень, мозговые оболочки и кости. Фармакокинетический профиль не зависит от пола, возраста, этнической принадлежности. Коррекция дозы препарата у пациентов с нарушением функции почек не требуется.

Доказательная база эффективности тайгециклина в лечении тяжелых инфекций

Несмотря на то что препарат относительно недавно появился на фармацевтическом рынке, уже накоплен достаточный опыт его клинического применения. К настоящему времени проведено несколько крупномасштабных исследований, в которых продемонстрирована высокая эффективность тайгециклина в лечении осложненных инфекций кожи и мягких тканей (оИКМТ), осложненных интраабдоминальных инфекций (оИАИ) и бактериемии у взрослых пациентов.

Одно из таких исследований, проведенное Bassetti et al. (2010), было посвящено изучению эффективности тайгециклина в качестве стартовой терапии у 207 пациентов с интраабдоминальными инфекциями, пневмонией, бактериемией, оИКМТ, фебрильной нейтропенией. Терапия была целенаправленной у 130 (63%) и эмпирической у 77 (37%) пациентов. В 78% случаев тайгециклин применяли в монотерапии, в остальных — в составе комбинированной схемы антибиотикотерапии. Во всех случаях микроорганизмы оказались чувствительными к тайгециклину. Средняя продолжительность терапии составила 13 дней (диапазон 6-28). Клинический успех был получен у 151 пациента (73% случаев). В 78% случаев тайгециклин был назначен в качестве монотерапии, в то время как 22% пациентов получали комбинированную терапию колистином (41%), меропенемом (24%), амикацином (20%) или ципрофлоксацином (15%). Клинический успех терапии был достигнут в 78% случаев с наибольшим уровнем эффективности при интраабдоминальных инфекциях (82%) и оИКМТ (78%). Микробиологическая эффективность (эрадикация возбудителя) составила 78%. Большинство пациентов, включенных в анализ, имели сопутствующую патологию и высокий риск инфицирования полирезистентными микроорганизмами. У половины пациентов с оИАИ были обнаружены MRSA и энтерококковая инфекция. Микробиологическая эффективность в отношении MRSA составила 80%, *Enterococcus* spp. — 76%, *E. coli* — 81%, *Acinetobacter baumannii* — 69%, *Klebsiella pneumoniae* — 89%. Таким образом, в данном исследовании тайгециклин продемонстрировал высокую эффективность и безопасность в лечении серьезных госпитальных инфекций, вызванных резистентными микроорганизмами.

Изучение эффективности тайгециклина у тяжелобольных пациентов с осложненными инфекциями (интраабдоминальными и/или кожи и мягких тканей) было проведено в Германии в ходе многоцентрового проспективного исследования С. Eckmann et al. (2011). В нем приняли участие 656 пациентов в критическом

состоянии (средний балл по шкале APACHE II — 19±8,2). 84% пациентов получали предшествующую антибиотикотерапию в среднем на протяжении 10 дней, из них у 41% были диагностированы оИАИ, у 16% — оИКМТ, у 13% — комбинация оИАИ и оИКМТ. У 55% пациентов оказались клинически неэффективны другие антибиотики, у 45% был высеян патоген, устойчивый к другим препаратам. 93% пациентов имели сопутствующую патологию, включая 35% пациентов с сахарным диабетом. В 51% случаев тайгециклин применяли в монотерапии. Средняя продолжительность курса лечения составила 11 дней. Клинический эффект (излечение/улучшение) был достигнут у 75% больных с оИАИ, у 82% — с оИКМТ, у 76% — с другими тяжелыми инфекциями, у 67% — с сепсисом. Общий показатель клинической эффективности в группе монотерапии тайгециклином составил 81,3%, в группе комбинированного лечения, пациенты которой находились преимущественно в более тяжелом состоянии, — 69,7%. Наиболее частыми возбудителями оИАИ были *E. faecium* (20%), *Escherichia coli* (19%) и *E. faecalis* (13%), оИКМТ — *S. aureus* (41%) и *E. coli* (12%). Чувствительными к тайгециклину оказались 94% выделенных штаммов, умеренной устойчивостью обладали 2% штаммов.

Таким образом, эти исследования продемонстрировали высокую эффективность тайгециклина, в том числе у больных с тяжелыми осложненными инфекциями и у пациентов с сопутствующей патологией, включая случаи, когда другие режимы предшествующей антибиотикотерапии оказались неэффективны.

Основные аспекты безопасности и переносимости тайгециклина

В целом проведенные на сегодняшний день клинические исследования продемонстрировали удовлетворительную переносимость тайгециклина. В клинических исследованиях III фазы у пациентов с оИАИ и оИКМТ лечение тайгециклином в общей сложности получили 1415 больных. Терапия тайгециклином была прекращена из-за развития нежелательных явлений, связанных с лечением, у 5% пациентов в группе тайгециклина и у 4,7% — в группе, получавшей препараты сравнения (у 5,3% пациентов при лечении ванкомицином в сочетании с азтреонамом и у 4,4% при использовании имипенема/циластатина). Нежелательные явления, которые чаще всего приводили к необходимости прекращения терапии, были тошнота (1,3%) и рвота (1%) у пациентов, получавших тайгециклин, сыпь (1,1%) — в группе ванкомицина в сочетании с азтреонамом и тошнота (1,1%) — у пациентов, получавших имипенем/циластатин. Эпизоды тошноты и рвоты обычно возникали на первые-вторые сутки лечения и в подавляющем большинстве случаев имели легкую или среднюю выраженность. Нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного тракта, хотя и регистрировались чаще в группе тайгециклина, редко приводили к преждевременному прекращению антимикробной терапии

(<2%), а частота назначения противорвотных препаратов у пациентов не различалась между группами тайгециклина и имипенема/циластатина. Механизм возникновения тошноты и рвоты на фоне терапии тайгециклином остается неясным.

Согласно объединенному анализу результатов исследований показатели летальности у пациентов, получавших тайгециклин и препараты сравнения, были сопоставимы (2,3 vs 1,6%, объединенные данные).

Режим дозирования тайгециклина

Тайгециклин вводится внутривенно капельно в течение 30-60 мин. Стартовая доза для взрослых составляет 100 мг, затем по 50 мг каждые 12 ч. Курс лечения при оИАИ и оИКМТ составляет 5-14 дней и, как правило, определяется тяжестью, локализацией инфекции и клиническим ответом пациента на лечение. Больным с легкими и среднетяжелыми нарушениями функции печени коррекция дозы не требуется. Пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью после введения начальной дозы тайгециклина 100 мг в последующем препарат назначают в дозе 25 мг каждые 12 ч. Пациентам с почечной недостаточностью и больным, находящимся на гемодиализе, а также пожилым лицам коррекция дозы не требуется.

Согласно результатам исследований *in vitro* тайгециклин не влияет на ферменты системы цитохрома P-450 и не подвергается метаболизму ферментными системами печени. В связи с этим безопасным является назначение тайгециклина совместно с ингибиторами или индукторами печеночных ферментов и лекарственными средствами, метаболизируемыми микросомальными ферментами печени.

Выводы

Тайгециклин обладает широким спектром антимикробной активности, который включает аэробные и анаэробные, грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, а также атипичные возбудители. Особенно важно подчеркнуть активность данного препарата в отношении полирезистентных микроорганизмов, вызывающих серьезные госпитальные инфекции.

По данным клинических исследований, тайгециклин демонстрирует высокую эффективность в лечении оИКМТ, оИАИ, бактериемии и других серьезных инфекций, вызванных резистентными грамположительными и грамотрицательными возбудителями, у взрослых пациентов.

Тайгециклин в целом отличается приемлемой переносимостью и не имеет значимых лекарственных взаимодействий.

На основании полученных в клинике данных в отношении тайгециклина следует пересмотреть традиционное мнение о недостаточной эффективности АМП с бактериостатическим механизмом действия при лечении серьезных инфекций.

Список литературы находится в редакции.

Подготовил Вячеслав Килимчук

UA-TYG-12-007

Статья опубликована при поддержке компании Pfizer