ЗМІСТ

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Витрум® Бьюти: красота – это просто! 13
В настоящее время оптимальным способом восполнения пула витаминов и минералов считается включение в ежедневный рацион витаминно-минеральных комплексов

Спробуй сам. Про переваги застосування мобільного додатку MedAssist 14

Оперативно о главном 32
Хроника ключевых событий в медицине

Реалии и перспективы развития фармацевтической отрасли в Украине
А.А. Крапивный, Д.Д. Гурак, Е.А. Нагорная и др. 43
По итогам II Международной конференции 3-5 июня, г. Киев

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Применение ривароксабана в терапии тромбоэмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен 31
Для снижения риска ВТЭ проводится лечение, краеугольным камнем которого является антикоагулянтная терапия

Реалии и перспективы лечения диабетической полинейропатии
Б.Н. Маньковский, Д. Зигле 33
Свое видение подходов к лечению ДПН представляют ведущие специалисты в области эндокринологии

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

Выбор НПВП для купирования болевого синдрома у пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата
Р.В. Сулик, А.В. Яворская 26
За последние годы количество НПВП значительно возросло, поэтому вопрос выбора препарата является неоднозначным

Ревмодайджест 27

Практические вопросы ведения пациентов с нарушениями ритма сердца
О.С. Сычев, Я.Ю. Думпис, О.И. Жаринов и др. 28-29
По итогам НПК Ассоциации аритмологов Украины, 19 мая, г. Киев

Кардиодайджест 30

НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ

Неврологічний огляд у загальномедичній практиці: з чого розпочати? Оцінка ходи
О.Є. Коваленко 36-37
У статті розглянуто практичні можливості оптимізації неврологічного огляду в практиці сімейного лікаря

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Новые стратегии диагностики и лечения эндокринных заболеваний
Ю.И. Караченцев, Е.В. Мисюра, О.Н. Ковалева и др. 34-35
По материалам НПК «Украинская школа эндокринологии», 5-6 июня, г. Харьков

АЛЕРГОЛОГІЯ, ДЕРМАТОЛОГІЯ

Еріус® – антигістамінний препарат вибору українських спеціалістів з різних галузей медицини 12

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата ГЕПТРАЛ®

Регистрационное свидетельство: № UA/6993/01/01, № UA/6993/02/01.

Состав

1 флакон с лиофилизированным порошком или 1 таблетка содержат 760 мг адеметионина 1,4-бутандисульфоната, что соответствует 400 мг катиона адеметионина.

Лекарственная форма

Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций. Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на систему пищеварения и процессы метаболизма. Код АТС А16А А02.

Показания

Внутрипеченочный холестаз у взрослых, в том числе у больных хроническим гепатитом различной этиологии и циррозом печени; внутрипеченочный холестаз беременных; депрессивные синдромы.

Противопоказания

Генетические дефекты, которые влияют на метиониновый цикл и/или вызывают гомоцистинурию и/или гипергомоцистеинемию (например, недостаточность цистатионин бета-синтазы, дефект метаболизма витамина B_{12}). Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.

Способ применения и дозы

Лечение обычно начинают с парентерального введения препарата с последующим его применением в форме таблеток или сразу с применения таблеток. Суточную дозу таблеток можно распределять на 2-3 приема. Готовить раствор для инъекций необходимо непосредственно перед применением. Таблетку препарата Гептрал® следует вынимать из блистера непосредственно перед приемом. Если таблетки имеют иной цвет (кроме от белого до желтоватого), необходимо отказаться от их применения.

Начальная терапия. Внутривенно или внутримышечно: рекомендованная доза составляет 5-12 мг/кг массы тела в сутки. Обычная начальная доза – 400 мг/сут, общая суточная доза не должна превышать 800 мг. Длительность начальной парентеральной терапии составляет 15-20 дней при лечении депрессивных синдромов и 2 нед при лечении заболеваний печени. Перорально (внутрь): рекомендованная доза – 10-25 мг/кг массы тела в сутки. Обычная начальная доза – 800 мг/сут, общая суточная доза не должна превышать 1600 мг. *Поддерживающая терапия:* по 2-4 таблетки в сутки (800-1600 мг/сут). Длительность терапии зависит от тяжести и течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Побочные реакции

По данным 22 проведенных клинических исследований лечения адеметионином, побочные реакции наблюдались у 7,2% от общего количества пациентов. Наиболее часто отмечались тошнота, боль в животе, диарея. *В клинических исследованиях* сообщалось о развитии следующих побочных явлений, причинную связь которых с препаратом не всегда было возможным установить: инфекции мочевыводящих путей; спутанность сознания, бессонница; головокружение, головная боль, парестезии; сердечно-сосудистые расстройства; приливы, поверхностный флебит; вздутие живота, боль в животе, диарея, сухость во рту, диспепсия, эзофагит, метеоризм, желудочно-кишечная боль, желудочно-кишечные расстройства, желудочно-кишечное кровотечение, тошнота, рвота; печеночная колика, цирроз печени; гипергидроз, зуд, кожные реакции; артралгия, мышечные судороги; астения, озноб, реакции в месте введения, гриппоподобные симптомы, слабость, периферические отеки, гипертермия. *При постмаркетинговом применении* наблюдались гиперчувствительность, анафилактоидные или анафилактические реакции, тревога, отек гортани, реакции в месте введения (очень редко с некрозом кожи), ангионевротический отек, аллергические кожные реакции; редко были сообщения о суицидальных мыслях/поведении.

Применение в период беременности или кормления грудью

Назначение высоких доз адеметионина в III триместре беременности не вызывало каких-либо побочных реакций. Адеметионин в I и II триместрах беременности следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для матери/риск для плода. В период кормления грудью адеметионин назначают только тогда, когда польза от его применения для матери превышает риск для младенца.

Дети

Безопасность и эффективность применения адеметионина у детей не установлены.

Взаимодействие

Было сообщение о развитии серотонинового синдрома у пациента, применявшего адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя роль адеметионина в данном случае допускается теоретически, следует с осторожностью его применять одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), препаратами и растительными средствами, содержащими триптофан.

Категория отпуска

По рецепту.

Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению препарата.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сообщить о нежелательном явлении или жалобе на качество препарата Вы можете в представительство компании.

За дополнительной информацией обращайтесь в представительство компании «Абботт Лабораториз ГмбХ» в Украине:
01032, г. Киев, ул. Жилянская, 110, 2-й этаж;
тел.: +38 044 498-60-80, факс: +38 044 498-60-81

PR-UA-HEP-12(04/14)

Наш сайт www.health-ua.com В среднем более 8000 посещений в день* • Архив «Медичної газети «Здоров'я України» с 2003 года *http://top.bigmir.net/report/58476