• Дайджест

Влияние заменителей соли на артериальное давление: метаанализ рандомизированных контролируемых исследований

В клинических исследованиях, в которых изучались эффекты заменителей хлорида натрия (поваренной соли) на артериальное давление (АД), были получены неоднозначные результаты. Цель настоящей работы – выполнить метаанализ рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), в которых оценивалось влияние потребления заменителей соли на уровни систолического (САД) и диастолического (ДАД) АД.

Методы. Поиск РКИ осуществляли в базах данных PubMed, Embase, Cochrane Library, Wanfang Data, CNKI по состоянию на декабрь 2013 г. Для оценки средней разницы в уровнях АД использовали модели случайных эффектов.

Результаты. В метаанализ включили 5 РКИ, в которых участвовали 1974 пациента. Результаты показали, что заменители соли оказывают статистически значимое влияние на САД (средняя разница -4,9 мм рт. ст.; 95% доверительный интервал от -7,3 до -2,5; $p < 0,001$) и ДАД (средняя разница -1,5 мм рт. ст.; 95% ДИ от -2,7 до -0,3; $p = 0,013$). В то же время отмечена существенная гетерогенность для САД и ДАД ($I^2 = 76,7\%$ и $I^2 = 65,8\%$ соответственно). Анализ чувствительности выявил, что эффект заменителей соли в отношении АД оставался достоверным при последовательном исключении из анализа отдельных РКИ. Систематическая ошибка, связанная с предпочтительной публикацией положительных результатов, не обнаружена ($p = 0,17$ и $p = 0,22$ для САД и ДАД соответственно).

Выводы. Проведенный метаанализ показал, что использование заменителей поваренной соли является эффективной стратегией снижения САД и ДАД, которая может широко применяться как для лечения, так и для профилактики артериальной гипертензии (АГ).

Peng Y.G., Li W., Wen X.X. et al. Effects of salt substitutes on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Clin Nutr.* 2014 Dec; 100 (6): 1448-54.

Нарастающий антигипертензивный эффект титрации дозы амлодипина в лечении артериальной гипертензии

Доказано, что даже небольшое снижение АД ассоциируется с уменьшением риска сердечно-сосудистых событий. В настоящей работе

представлены результаты двух post-hoc анализов, в которых оценивался антигипертензивный эффект амлодипина у пациентов, не ответивших на дозу 5 мг и впоследствии получавших дозу 10 мг.

Методы. В первом анализе изучались две подгруппы пациентов – в возрасте < 55 и ≥ 55 лет; во втором анализе исходы оценивались независимо от возраста больных.

Результаты. Анализ, проведенный с учетом возраста, показал статистически значимое снижение АД при увеличении дозы амлодипина с 5 до 10 мг/сут: уровни САД и ДАД у пациентов моложе 55 лет ($n = 253$) снизились на 12,8 и 8,0 мм рт. ст., у больных в возрасте ≥ 55 лет – на 12,1 и 6,7 мм рт. ст. соответственно (для всех сравнений $p < 0,0001$). Целевые уровни АД достигли 45,8 и 39,3% пациентов с возрасте < 55 и ≥ 55 лет соответственно. Частота побочных эффектов была одинаково низкой в обеих возрастных группах. Аналогичные результаты в отношении эффективности и безопасности были получены в анализе, проведенном без учета возраста пациентов.

Выводы. У больных АГ титрация дозы амлодипина с 5 до 10 мг позволяет значительно снизить АД, в том числе у пациентов старшей возрастной категории, что имеет большую клиническую значимость, поскольку возраст ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых событий.

Jeffers B.W., Bhambri R., Robbins J. Incremental Blood Pressure-Lowering Effect of Titrating Amlodipine for the Treatment of Hypertension in Patients Including Those Aged ≥ 55 Years. *Am J Ther.* 2014 Nov 3. [Epub ahead of print]

Связь между тревогой, депрессией, массой тела и артериальной гипертензией в период беременности

Цель исследования – проспективно изучить взаимосвязь между тревожными и депрессивными расстройствами, диагностированными по DSM-IV-TR, индексом массы тела (ИМТ), АД и уровнями АД во время беременности.

Методы. В исследование MARI (Maternal Anxiety in Relation to Infant Development) включили 306 женщин на ранних сроках беременности, которых впоследствии регулярно наблюдали в течение перипартального периода. С помощью композитного международного диагностического интервью для женщин (CIDI-V) оценивали наличие тревожных и депрессивных расстройств до беременности, потенциальные источники этих расстройств и ИМТ. В зависимости от дородового статуса пациенток распределили в одну из следующих групп: отсутствие тревожных и депрессивных расстройств, чистое депрессивное расстройство, чистое тревожное расстройство и коморбидное тревожно-депрессивное расстройство. Данные об уровнях АД получали из медицинских карт беременных. АД во время беременности определяли как САД ≥ 140 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 90 мм рт. ст. при ≥ 2 измерениях.

Результаты. В анализ включили 283 женщин, которым в период беременности не менее 4 раз измеряли АД. АД во время беременности диагностирована у 47 (16,6%) пациенток. После поправки на возраст, паритет родов, статус курения, профессию, уровень дохода семьи и уровень образования коморбидное тревожно-депрессивное расстройство ассоциировалось с достоверно более высоким АД (САД: коэффициент линейной регрессии $\beta = 3,0$; 95% ДИ 0,2-5,7; ДАД: $\beta = 2,3$; 95% ДИ 0,1-4,4). Наличие в анамнезе потенциальных источников тревоги было связано с повышенным риском АГ (относительный риск 1,1; 95% ДИ 1,0-1,3) и более высоким САД ($\beta = 0,4$; 95% ДИ 0,0-0,7). Кроме того, наблюдалась статистически значимая корреляция между ИМТ и АД в группе пациенток с чистым тревожным расстройством (ОР 1,5; 95% 1,1-2,1).

Выводы. Женщины с тревожно-депрессивными расстройствами, а также беременные с повышенной массой тела и ожирением, имеющие в анамнезе тревожные расстройства, относятся к группе повышенного риска развития АГ во время беременности. У таких пациенток в период гестации следует регулярно контролировать АД, а также использовать стратегии профилактики и ранней коррекции АГ, такие как оптимизация диеты и повышение уровня физической активности.

Winkel S., Einsle F., Pieper L. et al. Associations of anxiety disorders, depressive disorders and body weight with hypertension during pregnancy. *Arch Womens Ment Health.* 2014 Nov 25. [Epub ahead of print]

Подготовил **Алексей Терещенко**

НОРВАСК

Для людей. Для жизни.

Норваск® (амлодипина бесилат), таблетки по 5 мг и 10 мг, 30 или 60 таблеток в упаковке.

Краткая инструкция для медицинского использования препарата.

Показания к применению: артериальная гипертензия; хроническая стабильная стенокардия; вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала). **Способ применения и дозы.** Рекомендованная начальная доза препарата Норваск® составляет 5 мг 1 раз в сутки, максимальная суточная доза составляет 10 мг 1 раз в сутки. **Противопоказания:** известная повышенная чувствительность к дигидропиридинам, амлодипину или к какому-либо компоненту препарата; артериальная гипотензия тяжелой степени; шок (включая кардиогенный шок); обструкция выводящего тракта левого желудочка (например, стеноз аорты тяжелой степени); гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда. **Побочные реакции:** часто наблюдались такие побочные реакции, как сонливость, головокружение, головная боль, приливы, боль в брюшной полости, тошнота, отеки голеней, отеки, утомляемость. Для подробной информации см. полную инструкцию по применению препарата. **Особенности применения:** пациентам с сердечной недостаточностью, нарушением функции печени, а также пациентам пожилого возраста следует назначать препарат с осторожностью. Не рекомендуется применять Норваск® вместе с грейпфрутом или грейпфрутовым соком. Норваск® может оказывать незначительное или умеренное влияние на способность управлять автотранспортом или работать с другими механизмами. **Взаимодействие с лекарственными препаратами:** амлодипин следует с осторожностью назначать вместе с ингибиторами и индукторами CYP3A4. Гипотензивный эффект амлодипина потенцирует гипотензивный эффект других антигипертензивных препаратов. Из-за риска развития гиперкалиемии рекомендуется избегать применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, у склонных к злокачественной гипертермии пациентов, а также при лечении злокачественной гипертермии. **Фармакологические свойства:** амлодипин – антагонист ионов кальция (производное дигидропиридина), который блокирует поступление ионов кальция в миокард и к клеткам гладкой мускулатуры. **Категория отпуска:** по рецепту. Перед использованием препарата необходимо ознакомиться с полной инструкцией по применению. Информация для врачей и фармацевтов. Предназначена для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах на медицинскую тематику. Регистрационное свидетельство № UA/5681/01/01, UA/5681/01/02 от 26.10.11 г, 08.02.13.

За дополнительной информацией обращаться в:
Представительство "Файзер Ейч. Си. Пи. Корпорейшн" в Украине:
03038, г. Киев, ул. Амосова, 12, «Горизонт Парк» бизнес-центр, 12-13 этаж
Тел. (044) 291-60-50