Инструкции по медицинскому применению препаратов IPC19®, Імудон®, Імунорикс, Клацид®, Бруфен®

Імудон®

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Імудон®.

Р.С. № 837/11-300200000 від 06.04.2011 р.

Загальна характеристика: Імудон®– комплексний препарат лізатів бактерій у формі таблеток для розсмоктування білого чи майже білого кольору, плоскоциліндричної форми, із гладкою блискучою поверхнею, зі скошеними краями, м'ятним запахом, допускається незначна мармуровість. 1 таблетка містить суміш лізатів бактерій– 2,7 мг у перерахунку на суху речовину, в тому числі лізати бактерій L. acidophilus, L. delbrueckii ss lactis, L. helveticus, L. fermentum, S. pyogenes groupe A, S. sanguis groupe H, S. aureus, E. faecium, E. faecalis, K. pneumoniae ss pneumoniae, F. nucleatum ss fusiforme, C. pseudodiphtheriticum, C. albicans– 0,1575 мг. **Форма випуску:** таблетки для розсмоктування № 24, № 40. **Імунологічні та біологічні властивості:** Імудон®– антигенний полівалентний комплексний препарат, до складу якого входять інактивовані мікроорганізми, що найчастіше наявні при патологічних процесах порожнини рота. Протизапальні та протиінфекційні властивості препарату зумовлені особливостями імунобіологічної дії: підвищенням фагоцитарної активності з якісним покращанням фагоцитозу; збільшенням кількості лізоциму слини; стимуляцією і збільшенням кількості імунокомпетентних клітин, які відповідають за продукцію антитіл; зростанням рівня локальних антитіл (секреторні імуноглобуліни А слини). Терапевтичний ефект препарату Імудон® спрямований безпосередньо чи опосередковано на патологічні стани порожнини рота і глотки, симптомами яких є біль, еритема, запалення ясен, виразки, неприємний запах із рота. **Показання до застосування:** Лікування і профілактика запальних та інфекційних уражень порожнини рота і глотки, а саме: поверхневого і глибокого парадонтозу, пародонтиту, стоматиту (зокрема афтозного), глоситу; еритематозного і виразкового гінгівіту; дисбактеріозу ротової порожнини; інфекцій після видалення зубів, імплантації штучних зубних коренів; виразок, які викликані зубними протезами; фарингіту; хронічного тонзиліту; перед- і післяопераційна профілактика інфекційних ускладнень після тонзилектомії. **Протипоказання:** підвищена чутливість до компонентів препарату. Діти віком до 3 років. **Спосіб застосування та дози**: для дорослих і дітей віком понад 14 років: при лікуванні гострих запальних захворювань порожнини рота і глотки та загостренні хронічних захворювань приймають по 8 таблеток на добу. Таблетки розсмоктують (не розжовуючи) у порожнині рота з інтервалом 1-2 години. Середня тривалість курсу лікування– 10 днів. Для профілактики загострення хронічних захворювань порожнини рота і глотки приймають по 6 таблеток на добу. Таблетки розсмоктують (не розжовуючи) у порожнині рота з інтервалом 2 години. Середня тривалість курсу– 20 днів. Рекомендовано повторювати профілактичні курси лікування препаратом Імудон® 3-4 рази на рік. Для дітей віком 3-14 років: для лікування гострих і при загостренні хронічних захворювань порожнини рота і глотки, а також для профілактики приймають по 6 таблеток на добу. Таблетки розсмоктують (не розжовуючи) у порожнині рота з інтервалом 1-2 години. Тривалість курсу лікування при гострих захворюваннях становить 10 днів, для профілактики загострення хронічних захворювань– 20 днів. Рекомендовано повторювати профілактичні курси препаратом Імудон® 3-4 рази на рік. **Побічна дія:** є окремі повідомлення про алергічні реакції (висип, кропив'янка, ангіоневротичний набряк), а також реакції з боку шлунково-кишкового тракту (біль у шлунку, нудота і блювання). **Особливості застосування:** Діти віком 3-6 років розсмоктують таблетки під обов'язковим наглядом дорослих. Не слід вживати їжу й воду, а також полоскати ротову порожнину протягом однієї години після застосування препарату, щоб не знижувати його терапевтичну ефективність. При призначенні препарату пацієнтам, які перебувають на безсольовій дієті чи дієті зі зниженим умістом солі, необхідно враховувати, що таблетка препарату Імудон® містить 15 мг натрію. Інформації про те, що препарат впливає на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами, немає. **Період вагітності та годування груддю.** У зв'язку з відсутністю достатньої кількості даних щодо застосування препарату Імудон® у цієї категорії жінок прийом у період вагітності та годування груддю не рекомендований. Релевантні дослідження на тваринах і епідеміологічні дослідження відсутні. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами:** невідома. Імудон® можна застосовувати з лікарськими засобами, які належать до інших груп препаратів. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Повідомити в «Абботт» про небажані явища під час застосування препарату чи скаргу на якість препарату ви можете за телефонами (цілодобово): по Україні (та країнах СНД) +38 (044) 498- 60-80; у Республіці Білорусь +375 17 256-79-20, у Республіці Узбекистан +998 71 129-05-50.

За додатковою інформацією звертайтеся до Представництва «Абботт Продактс ГмбХ» в Україні.

Представництво «Абботт Продактс ГмбХ» в Україні: 01032, Київ, вул. Жилянська, 110. Тел.: +38 (044) 498-60-80. Факс: +38 (044) 498-60-81.

IPC 19®

Лікує нежить і простуду. Допомагає одужати швидше. Для дітей з 2 років та дорослих.

Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.

Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з повною інструкцією для медичного застосування препарату IPC 19®.

Р. С. МОЗ України № 324/12300200000 від 08.08.2012.

Коротка інформація по препарату IPC 19®.

Загальна характеристика: основні властивості лікарської форми: IPC 19® є комплексним препаратом лізатів бактерій, що міститься у вигляді розчину для інтраназального введення в аерозольній упаковці, та являє собою прозору безбарвну, іноді з жовтуватим відтінком рідину, із слабким запахом ароматизатора на основі неролу. **Якісний та кількісний склад**: 100 мл містить 43,27 мл суспензії лізатів бактерій*; активні речовини: лізати бактерій*, Streptococcus pneumoniae тип I – 1,11 мл, Streptococcus pneumoniae тип II – 1,11 мл, Streptococcus pneumoniae тип III – 1,11 мл, Streptococcus pneumoniae тип V – 1,11 мл, Streptococcus pneumoniae тип VIII – 1,11 мл, Streptococcus pneumoniae тип XII – 1,11 мл, Haemophilus influenzae тип B – 3,33 мл, Klebsiella pneumoniae ss pneumoniae – 6,66 мл, Staphylococcus aureus – 9,99 мл, Acinetobacter calcoaceticus різновид baumannii – 3,33 мл, Moraxella catarrhalis – 2,22 мл, Neisseria subflava різновид flava – 2,22 мл, Neisseria subflava різновид perflava – 2,22 мл, Streptococcus pyogenes група A– 1,66 мл, Streptococcus dysgalactiae група C – 1,66 мл, Enterococcus faecium – 0,83 мл, Enterococcus faecalis – 0,83 мл, Streptococcus група G – 1,66 мл. **Форма випуску**: Розчин для інтраназального введення в аерозольній упаковці. Імунологічні і біологічні властивості: IPC 19® є комплексним препаратом лізатів бактерій – найбільш розповсюджених збудників респіраторних інфекцій. Лізис мікроорганізмів здійснюється на основі оригінальної біологічної методики, яка дозволяє отримати непатогенні антигени із збереженням специфічних властивостей кожного штаму. Завдяки цьому лізати спроможні викликати у слизовій оболонці захисні імунні реакції, ідентичні реакціям на похідні збудників інфекцій: стимуляцію і розмноження імунокомпетентних клітин, підвищення рівня лізоциму та інтерферону в секреті, збільшення кількості локальних антитіл, особливо імуноглобуліну А, підвищення фагоцитарної активності, яка сприяє елімінації збудників інфекції з організму. **Показання до застосування:** Профілактика і лікування у дорослих і дітей з 2 років гострих і хронічних інфекційних захворювань ЛОР органів і верхніх дихальних шляхів: гострого і хронічного риніту, рецидивуючого ринотрахеобронхіту, трахеїту, хронічного бронхіту, запалення аденоїдів, синуситу, фарингіту, ларингіту, отиту, тонзиліту, бронхіальної астми, ускладнень грипу та інших вірусних респіраторних інфекцій, а також у перед- і післяопераційний період для профілактики інфекційних ускладнень після хірургічних втручань на ЛОР-органах. **Протипоказання**: Підвищена чутливість до компонентів препарату. Препарат IPC 19® не слід призначати пацієнтам з аутоімунними захворюваннями. **Спосіб застосування і дози**: Лікування (під час інфекції): 1 вприскування у кожну ніздрю 2-5 разів на добу до зникнення симптомів захворювання. Профілактика (перед початком зимового сезону і в разі хронічних захворювань 2-3 рази на рік): 1 вприскування в кожну ніздрю 2 рази на добу протягом 2 тижнів. **Побічна дія**: Препарат зазвичай добре переноситься, але на початку лікування можлива поява таких реакцій, як чихання і посилення виділень з носа. Ці реакції є свідченням стимуляції імунної системи і самі по собі зникають без додаткового лікування. Іноді корисним може бути тимчасове (на 1-2 доби) зниження дози IPC 19® наполовину. Дуже рідко можуть виникати алергічні шкірні реакції у вигляді висипань, кропив'янки і ангіоневротичного набряку. **Особливості застосування**: Іноді на початку лікування можливе підвищення температури тіла (>39°C). У такому випадку лікування слід відмінити. Однак треба відрізняти такий стан від підвищення температури тіла, що супроводжується нездужанням, яке може бути пов'язане з розвитком захворювання ЛОР-органів. За наявності системних клінічних ознак бактеріальної інфекції питання про доцільність призначення системних антибіотиків вирішується лікарем. У разі призначення препаратів на основі бактеріальних лізатів з метою імуностимуляції у пацієнтів з бронхіальною астмою можлива поява нападів астми. У такому випадку рекомендується припинити лікування та не приймати препарат даного класу у майбутньому. IPC 19® не впливає на здатність керувати транспортними засобами і працювати з механізмами. **Запобіжні засоби при застосуванні**: Уміст флакона знаходиться під тиском. Захищати від нагрівання вище 50°C і потрапляння прямого сонячного світла. Не відкривати флакон, навіть якщо він порожній, не спалювати і не проколювати його. **Застосування в період вагітності та годування груддю**: через відсутність достатньої кількості даних щодо потенційної можливості тератогенного або токсичного впливу на плід, застосування препарату в період вагітності та годування грудю не рекомендовано. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами**: випадки негативної взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі. У випадку появи клінічних симптомів бактеріальної інфекції можливе призначення антибіотиків на фоні застосування IPC 19®. **Категорія відпуску**: без рецепту. Повна інформація про препарат міститься в інструкції з медичного застосування.

Інформація призначена для пацієнтів

Виробники: Абботт Хелскеа САС. Адреса: Рут де Бельвіль, Льйо ді Мелар, 01400 Шатийон-сюр-Шаларон, Франція. Route de Belleville, Lieu dit Maillard, 01400 Chatillon-sur-Challaronne.

ВАТ «Фармстандарт-Томськхімфарм». Адреса: Росія, 634009, м. Томськ, пр. Леніна, 211.

Повідомити про небажані явища або скарги на якість препарату ви можете в Представництво «Абботт Лабораторіз С.А.» в Україні за телефоном +38 (044) 498-60-80. За додатковою інформацією звертайтесь до Представництва «Абботт Лабораторіз С.А.» в Україні. Представництво «Абботт Лабораторіз С.А.» в Україні: 01032, Київ, вул. Жилянська, 110, 2-й поверх, тел. +38 (044) 498-60-80, факс +38 (044) 498-60-81. Реклама лікарського засобу.

* Кладова О.В. Местный иммуномодулятор ИРС 19® в комплексной терапии ОРЗ//Детские инфекции, 2006, № 4, стр. 51-54.

Клацид®

Краткая информация по медицинскому применению препаратов

Клацид®, таблетки, покрытые оболочкой по 250 мг.

Р.С. № UA/2920/03/01.

Клацид СР, таблетки, покрытые оболочкой пролонгированного действия по 500 мг.

Р.С. № UA/2920/01/01;

Клацид®, гранулы для приготовления суспензии 125 мг/5 мл 250 мг/5 мл.

Р.С. № UA/2920/04/01;

Клацид®, гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл.

Р.С. № UA/2920/04/02.

Состав: Клацид® – 1 таблетка содержит кларитромицина 250 мг. Клацид СР – 1 таблетка содержит 500 мг кларитромицина; Клацид® суспензия – 5 мл готовой суспензии содержат кларитромицина 125 или 250 мг.

Фармакотерапевтическая группа. Противомикробные средства для системного применения. Макролиды. АТС J01F A09. **Показания:** Для всех форм выпуска: лечение инфекций, вызванных чувствительными к кларитромицину микроорганизмами. Клацид® таблетки по 250 мг, Клацид® суспензия, Клацид СР: инфекции верхних дыхательных путей, то есть носоглотки (тонзиллит, фарингит) и инфекции придаточных пазух носа; инфекции нижних дыхательных путей (бронхит, острая крупозная пневмония и первичная атипичная пневмония); инфекции кожи и мягких тканей. Клацид® суспензия, Клацид® таблетки по 250 мг: диссеминированные или локализованные микобактериальные инфекции, вызванные Mycobacterium avium или Mycobacterium intracellulare, локализованные инфекции, вызванные Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum или Mycobacterium kansasii. Клацид® таблетки по 250 мг: острые и хронические одонтогенные инфекции. Клацид® суспензія: острый средний отит. **Противопоказания:** Повышенная чувствительность к макролидным антибиотикам и другим компонентам препарата. Одновременное применение кларитромицина и любого из следующих препаратов: астемизол, цизаприд, пимозид, терфенадин, алкалоиды спорыньи (например, эрготамин, дигидроэрготамин), ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины – ловастатин или симвастатин), пероральный мидазолам, колхицин (пациентам с почечной или печеночной недостаточностью). Противопоказано пациентам, имеющим в анамнезе удлинение интервала QT или желудочковые аритмии сердца, включая пируэтную желудочковую тахикардию (torsades de pointes). Гипокалиемия (риск удлинения интервала QT). Тяжелая печеночная недостаточность и сопутствующая почечная недостаточность. Одновременное применение кларитромицина (и других сильных ингибиторов CYP3A4) с (см. «Особенности применения», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Клацид СР противопоказан при клиренсе креатинина менее 30 мл/мин (поскольку эта форма препарата не позволяет уменьшить дозу ниже 500 мг в день). **Способ применения, дозы:** Клацид® таблетки по 250 мг: рекомендуемая доза и детей старше 12 лет составляет 250 мг каждые 12 часов, при более тяжелых инфекциях дозу можно увеличить до 500 мг каждые 12 часов. Обычная продолжительность лечения зависит от степени тяжести инфицирования и составляет от 6 до 14 дней. Клацид СР: Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет составляет 500 мг 1 раз в день во время еды. При более тяжелых инфекциях дозу можно увеличить до 1000 мг 1 раз в день. Обычная продолжительность лечения составляет от 5 до 14 дней, за исключением лечения внебольничной пневмонии и синуситов, которые требуют 6-14 дней терапии. Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая. Клацид® суспензия: применяется у детей с 6 месяцев до 12 лет. Для лечения немикобактериальных инфекций рекомендованная доза составляет 7,5 мг/кг 2 раза в сутки до максимальной – 500 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения обычно составляет 5-10 дней в зависимости от вида возбудителя и тяжести заболевания. Детям с массой тела до 8 кг дозу необходимо рассчитывать на килограмм массы тела (7,5 мг/кг 2 раза в сутки). Суспензию применяют независимо от приема пищи, поскольку пища не влияет на биодоступность кларитромицина. **Побочные реакции:** Частыми и распространенными побочными реакциями при лечении кларитромицином взрослых и детей является боль в животе, диарея, тошнота, рвота и нарушение вкуса. Эти побочные реакции обычно незначительно выражены и согласуются с известным профилем безопасности макролидных антибиотиков. Во время клинических исследований не было выявлено существенных различий в частоте этих побочных реакций между группами пациентов, у которых имелись или отсутствуют микобактериальные инфекции. **Фармакологические свойства:** Кларитромицин оказывает бактерицидное действие против нескольких штаммов бактерий: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis. **Особенности применения**: Кларитромицин не следует назначать беременным женщинам без тщательной оценки соотношения «польза/риск», особенно в I триместре беременности. Длительное или повторное применение антибиотиков может вызвать чрезмерный рост нечувствительных бактерий и грибов. При возникновении суперинфекции следует прекратить применение кларитромицина и начать соответствующую терапию. С осторожностью следует применять препарат у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью. **Категория отпуска:** по рецепту. Полная информация содержится в инструкции по применению препарата.

Информация предназначена для специалистов.

Сообщить в представительство «Абботт» о нежелательных явлениях при применении препарата или о жалобах на качество препарата вы можете по телефонам (круглосуточно): в Украине (и странах СНГ) +38(044) 498-60-80. За дополнительной информацией обращайтесь в представительство «Абботт» в Украине: 01032, г. Киев, ул. Жилянская, 110. Телефон: +38 (044) 498-60-80. Факс: +38 (044) 498-60-81.

ІМУНОРИКС (IMUNORIX)

Коротка інформація про препарат

Р.С. № UA/9638/01/01 від 13.05.2009 р.

Склад: Діюча речовина: 7 мл розчину (1 однодозовий флакон) містять 400 мг підотимоду. **Лікарська форма.** Розчин оральний. **Фармакотерапевтична група.** Препарати, які стимулюють процеси імунітету.

Код АТС L03A; X05.

Показання для застосування. Стимуляція встановленого зниження клітинного імунітету на фоні інфекцій дихальних або сечовивідних шляхів. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Дитячий вік до 3 років. Період вагітності та годування груддю. **Спосіб застосування та дози.** Дорослі: уміст 2 однодозових флаконів по 400 мг двічі на добу протягом 15 діб. Дози й тривалість застосування препарату можуть бути відкоректовані залежно від ступеня тяжкості й виразності симптомів захворювання. Тривалість курсу – не більше 90 діб. Діти, старші 3 років: уміст 1 однодозового флакона по 400 мг двічі на добу протягом 15 діб. Дози й тривалість застосування препарату можуть бути скореговані залежно від ступеня тяжкості й виразності симптомів захворювання. Тривалість курсу – не більше 90 діб. У лікуванні рецидивуючих інфекційних захворювань пацієнтів із ризиком або імунодефіцитом в анамнезі рекомендовано застосовувати 800 мг на добу перорально для дорослих та 400 мг на добу для дітей протягом 60 днів як підтримуючу терапію. Оскільки прийом їжі впливає на всмоктування препарату, його слід застосовувати між прийомами їжі. **Побічні реакції.** На сьогоднішній день побічних реакцій у пацієнтів, які приймали Імунорикс, зафіксовано не було. **Застосування у період вагітності або годування груддю.** Хоча при дослідженні у тварин не було виявлено ніякого впливу підотимоду на репродуктивну функцію, однак застосування препарату протягом вагітності та періоду годування груддю не рекомендується. **Діти.** Застосовують у дітей віком від 3 років. **Особливості застосування.** Препарат слід застосовувати з обережністю у пацієнтів із синдромом гіперімуноглобулінемії Е, а також пацієнтам із спадковою схильністю до алергійних захворювань та пацієнтам, у яких раніше виникали алергійні реакції. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Не можна застосовувати підотимод одночасно з препаратами з імуностимулювальною та імунодепресивною активністю. Підотимод часто поєднувався з антибіотиками та іншими лікарськими засобами (наприклад, антипіретиками), що підтверджує відсутність взаємодії його з цими препаратами. Препарат може взаємодіяти з лікарськими засобами, що інгібують або стимулюють активність лімфоцитів. **Фармакодинаміка.** Підотимод виявляє свої ефекти шляхом стимуляції і регуляції клітинної імунної реакції. При дефіциті Т-лімфоцитів, які у фізіологічних умовах виконують роль координатора специфічного імунітету, підотимод шляхом часткового заміщення або підсилення функцій тимуса індукує дозрівання Т-лімфоцитів і надбання ними повної імунокомпетентності. Крім того, підотимод стимулює макрофаги, які відповідають за захоплення антигену. Здатність організму захищатися від інфекційних агентів залежить від ефективності специфічного імунного (клітинного й гуморального) захисту. **Категорія відпуску:** за рецептом.

Інформація призначена для фахівців

Інструкція про медичне застосування препарату Імунорикс.

Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату.

Повідомити в представництво «Абботт» про небажані явища при застосуванні препарату або про скарги на якість препарату ви можете за телефонами (цілодобово): в Україні (та країнах СНД) +38 (044) 498-60-80.

За додатковою інформацією звертайтесь до Представництва «Абботт» в Україні: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110. Телефон: +38 (044) 498-60-80. Факс: +38 (044) 498-60-81.

БРУФЕН®

Коротка інформація для медичного застосування препарату БРУФЕН®

Склад лікарського засобу: діюча речовина: ібупрофен; 5 мл сиропу містять ібупрофену 100 мг. Лікарська форма. **Сироп. Фармакотерапевтична група.** Нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби.

Р.С. МЗ Украины № UA/13154/01/01 от 18.08.2013 № 376.

Код АТС M01 A E01.

Показання для застосування. Короткотривале лікування пропасниці та болю у дітей. **Протипоказання.**Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента препарату, або до ацетилсаліцилової кислоти, або до інших аналгетичних, жарознижувальних та нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ), особливо якщо гіперчутливість асоційована з носовими поліпами, ангіоневротичним набряком та/або бронхіальною астмою. Тяжка печінкова недостатність. Тяжка ниркова недостатність (клубочкова фільтрація <30 мл/хв). Тяжка серцева недостатність. Тяжкий перебіг виразкової хвороби або виразкова хвороба в активній фазі. Шлунково-кишкова кровотеча або перфорація в анамнезі, пов'язана з прийомом НПЗЗ, або у пацієнтів з активною або в анамнезі рецидивуючою виразковою хворобою/кровотечею (2 або більше епізодів підтвердженого утворення виразки або кровотечі). Підвищена схильність до кровотечі. Спосіб застосування та дози**. Діти.** Застосовують у дітей з масою тіла від 7 кг. Для дітей добова доза становить 20 мг/кг, яку слід розділити на 3-4 прийоми. Для правильного розрахунку добової дози препарату вважають, що на 1 кг маси тіла дитини припадає 1 мл сиропу, що еквівалентно 20 мг ібупрофену (наприклад, для дитини з масою тіла 9 кг застосовують 9 мл сиропу на добу, що еквівалентно 180 мг ібупрофену). Для розрахунку разової дози добову дозу слід розділити на 3-4 прийоми. Бруфен®, сироп 20 мг/мл, не рекомендований для призначення дітям з масою тіла менше 7 кг. Сироп можна застосовувати, використовуючи мірний шприц, що знаходиться в упаковці разом з препаратом. Препарат можна застосовувати натще. Пацієнтам, які страждають на захворювання ШКТ, препарат слід приймати під час їди. Немає особливих рекомендацій щодо того, чи потрібно запивати препарат. Без консультації лікаря препарат необхідно застосовувати не більше 3 діб. **Побічні ефекти** Побічні реакції, про які повідомлялося у зв'язку з прийомом ібупрофену, подібні до тих, що проявляються при застосуванні інших аналгетиків, антипіретиків та НПЗЗ. Найчастіше розвиваються побічні реакції з боку шлунково-кишкового тракту. Можуть спостерігатися виразкова хвороба, перфорація або шлунково-кишкова кровотеча, іноді з летальним наслідком. Рідко спостерігалась шлунково-кишкова перфорація після прийому ібупрофену. Після застосування Бруфену® повідомлялося про нудоту, блювання, діарею, метеоризм, запор, диспепсію, біль в епігастрії, печію, абдомінальний біль, мелену, гематемезис, виразковий стоматит, загострення коліту та хвороби Крона

Особливі застереження. Застосування в період вагітності або годування груддю**.** Препарат призначений для лікування дітей. Ібупрофен протипоказаний протягом третього триместру вагітності.

Категорія відпуску. **Без рецепта.**

Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату.

Інформація призначена для фахівців.

Повідомити Abbott про небажане явище при застосуванні препарату або про скаргу на якість препарату ви можете за телефонами (цілодобово): в Україні (та країнах СНД) +380 44 498 6080; у Республіці Білорусь +375 17 256 7920, у Республіці Узбекистан + 998 71 129 0550.

PR-UA-ALL RTI-01(02/14)