

Оригінальний дезлоратадин

ЕРІУС®**НАУКА ПРОТИ АЛЕРГІЇ**

ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА¹
усуває різні симптоми алергії



ПОТРІЙНА ДІЯ¹
протиалергійна, протизапальна, антигістамінна



ЛИШЕ 1 РАЗ НА ДОБУ¹
активний протягом 27 годин

¹ Інструкція для медичного застосування препарату «Еріус», затверджена наказом МОЗУ №46 від 25.01.12. Р.п.: таблетки – наказ МОЗ України №46 від 25.01.2012 №UA/5827/01/01; сироп – наказ МОЗ України №77 від 01.02.2013 №UA/5827/02/01. Інформація, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів. ТОВ «Байер», 04071, Київ, вул. Верхній Вал, 4-Б, тел.: +38(044) 220-33-00, факс: +38(044)230-33-01. www.bayer.ua.
Реклама лікарського засобу. Інформація призначена для медичних установ та медичних або фармацевтичних представників.



Эриус® — многолетний флагман в борьбе с аллергией

Эриус® является наиболее часто назначаемым препаратом среди антигистаминных средств в мире (по данным IMS MIDAS MAT, 2009). Эриус® считается препаратом выбора в лечении аллергического ринита (АР) – как интермиттирующего (ИАР), так и персистирующего (ПАР). Высокая эффективность такой терапии подтверждена более чем в 13 крупных исследованиях в мире, количество менее масштабных локальных отчетов не подлежит точному анализу (G.W. Canonica, 2007).

Эффективность Эриуса реализуется за счет 3 основных механизмов действия:

- антигистаминного (препарат является мощнейшим периферическим блокатором H_1 -гистаминовых рецепторов);
- противовоспалительного (тормозит высвобождение основных медиаторов воспаления и обеспечивает замедление миграции эозинофилов в ткани-мишени);
- противоаллергического (подавляет продукцию гистамина, лейкотриена C4, простагландина D2 и др.).

Препарат Эриус® характеризуется быстрым началом действия (через 30 мин после его приема) и максимальной продолжительностью эффекта (период полувыведения составляет 27 ч, что значительно больше, чем у лоратадина и цетиризина).

В исследовании, посвященном изучению эффективности Эриуса при ИАР, показана достоверная эффективность препарата в устранении симптомов АР по шкале TSS (88% по сравнению с плацебо уже после первого приема). Терапия препаратом ассоциируется с улучшением качества жизни пациентов:



**ЭРИУС - БЫСТРО.
ЭФФЕКТИВНО. КАЖДЫЙ ДЕНЬ**

**ЭРИУС - МОЩНЫЙ СТАРТ:
БЫСТРОЕ УСТРАНЕНИЕ НАЗАЛЬНЫХ СИМПТОМОВ³**



ЭРИУС улучшает носовое дыхание в течение 30 минут после встречи с аллергеном³

**ЭРИУС - СТОЙКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
НАДОЛГО**



3. Horak F, Stubner UP, Ziegelmayer R, Ing D, Harris AG. J Allergy Clin Immunol. 2002;109:956-961

4. Agrawal DK. Pharmacology and clinical efficacy of Desloratadine as an anti-allergic and anti-inflammatory drug. Exp Opin Invest Drugs. 2001; 10:547-560.

так, на фоне приема Эриуса в 4 раза повышается дневная активность пациентов с АР, достоверно снижается количество пропусков школьных занятий, уменьшаются проявления сонливости в течение дня (J. Bousquet et al., 2008). Также препарат эффективен при лечении ПАР. Согласно результатам исследования, оценивавшего результативность влияния на симптомы аллергии по шкале TSS, Эриус® был достоверно эффективнее плацебо (на 67%), при этом длительность купирования симптомов достигала 85 дней, позволяя улучшить качество жизни пациентов с ПАР в среднем на 44%.

Безопасность Эриуса доказана и подтверждена многочисленными международными рандомизированными клиническими исследованиями. Так, в ходе масштабных исследований с участием приблизительно 48 тыс. пациентов частота побочных эффектов не превышала 0,44% (n=212), не было отмечено

клинически значимого взаимодействия препарата с сопутствующей терапией и продуктами питания. Вероятность возникновения седативных эффектов Эриуса за счет высокой селективности блокады H_1 -рецепторов стремится к нулю и, например, в 6 раз ниже, чем у левоцетиризина (D. Layton, 2006).

Эриус® — эффективный препарат для купирования симптомов АР — является наиболее назначаемым антигистаминным средством в мире. Препарат обладает антигистаминным, противовоспалительным и противоаллергическим действием, значительно улучшает качество жизни пациентов с ИАР и ПАР, характеризуется хорошим профилем безопасности и отсутствием седативного эффекта, в т. ч. у пациентов, отмечающих таковой при терапии левоцетиризином.

Список литературы находится в редакции.

Подготовила **Александра Меркулова**

