



Амоксициллин

Антациды (алюминия гидроксид, магнезия гидроксид)

Бисакодил

Висмута субсалицилат

Бутилскополамин

Циметидин

Кетоконазол

Ципрофлоксацин

Кларитромицин

Кломипрамин

Декслансопразол

Домперидон

Эзомепразол

Фамотидин

Оральные контрацептивы

Лактулоза

Лансопразол

Левифлоксацин

Линаклотид

Лоперамид

Макрогол

Мебеверин

Месалазин/месаламин

Метоклопрамид

Метронидазол

Мизопростол

Мосаприд

Омепразол

Винбластин

Отिलония бромид

Панкреатин

Пантопразол

Пирензепин

Рабепразол

Ранитидин

Клопидогрель

Симетикон

Альгинат натрия

Сукральфат

Сульфасалазин

Тиропрамид

УДХК

Эссенциальные фосфолипиды

Кофеин

Молочные продукты (не)

L-аргинина глутамат

Масло примулы

Ромашка девичья

Продукты, содержащие кофеин

Продукты, содержащие сахар

Продукты, содержащие глютен

Продукты, содержащие лактозу

Продукты, содержащие соль

Продукты, содержащие алкоголь

Продукты, содержащие жир

Продукты, содержащие белок

Продукты, содержащие витамин С

Продукты, содержащие витамин В

Продукты, содержащие витамин Е

Продукты, содержащие витамин К

Продукты, содержащие витамин А

Продукты, содержащие витамин Д

Продукты, содержащие витамин Ф

Продукты, содержащие витамин Р

Продукты, содержащие витамин С

Продукты, содержащие витамин В

Продукты, содержащие витамин Е

Продукты, содержащие витамин К

Продукты, содержащие витамин А

Продукты, содержащие витамин Д

Продукты, содержащие витамин Ф

Продукты, содержащие витамин Р

Продукты, содержащие витамин С

Продукты, содержащие витамин В

КРАТКОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ПО ВОЗАИМОДЕЙСТВИЯМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

Как пользоваться диаграммой

Взаимодействие между двумя ЛС обозначается символом, который находится на пересечении вертикального столбца и горизонтальной строки. Например, в случае взаимодействия между месалазином и омепразолом символ показывает тип взаимодействия на препарат, который находится во взаимодействии. Цвет символа, в данном случае диаграмма показывает, что эффекты месалазина/месаламина и степень взаимодействия.

Символы



Противопоказано/опасно



Усиливающий эффект



Ослабляющий эффект



Токсическая реакция



Единичные случаи взаимодействия



Осторожно! Возможно взаимодействие



Аддитивный эффект

Эта диаграмма показывает взаимодействие между лекарственными средствами, а не между продуктами питания и лекарственными средствами. Эта диаграмма не является руководством к действию.

Лекарственные препараты

Продукты питания и диетические добавки

Среди лекарственных средств, содержащих ЭФЛ, наиболее изученным является оригинальный препарат Эссенциале® форте Н. В контексте обсуждаемой проблемой важными преимуществами Эссенциале® форте Н являются отсутствие взаимодействий с лекарственными препаратами или пищевыми продуктами, а также способность защищать печень от неблагоприятных эффектов других лекарственных препаратов, в то числе в случае необходимости назначения комбинированной фармакотерапии.