


Комплексне рішення при кислотозалежних захворюваннях¹

- Впливає на різні ланки патогенезу
- Попереджує розвиток рецидивів і ускладнень
- Суттєво скорочує тривалість курсу лікування

ПЕРІОДИЧНА ПЕЧІЯ (рідше 2 разів на тиждень)²



Маалокс®. Спосіб застосування.⁸
Через 1–1,5 години після їди або у випадку виникнення болю: 1–2 таблетки розсмоктати або розжувати.

ГЕРХ

(печія 2 або більше разів на тиждень протягом 4 тижнів або довше)^{2,3}



Езомеалокс. Спосіб застосування при ГЕРХ.⁹

- Ерозивний рефлюкс-езофагіт: 40 мг 1 раз на добу протягом 4 тижнів
- Тривале лікування рецидивів у пацієнтів з вилікованим езофагітом: 20 мг 1 раз на добу
- Симптоматичне лікування ГЕРХ: 20 мг 1 раз на добу пацієнтам без езофагіту

Капсулу можна ковтнути цілком, розчинити в 100 мл води або ввести через назогастральний зонд.

Спосіб застосування та дози препарату Езомеалокс. 20 мг 1 раз на добу: довготривале лікування рецидивів у пацієнтів із вилікованим езофагітом; симптоматичне лікування гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби; лікування та профілактика виразок, спричинених тривалим застосуванням нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) (курс: 4–8 тижнів). 20 мг 2 рази на добу в комбінованій терапії впродовж 7 днів: лікування виразки дванадцятипалої кишки, пов'язаної з *Helicobacter pylori*; запобігання рецидивам пептичних виразок у хворих на виразки, спричинених *Helicobacter pylori*. 40 мг 1 раз на добу протягом 4 тижнів: лікування ерозивного рефлюкс-езофагіту, продовження лікування після внутрішньовенної терапії для профілактики повторної кровотечі з пептичної виразки. 40 мг 2 рази на добу: лікування синдрому Золлінгера–Еллісона.⁹

¹ Старостин Б.Д., Старостина Г.А. Сочетанная терапия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // Русский медицинский журнал. — 2009. — Т. 17, № 4. — С. 238–240. ² Moraes-Filho JPP et al., Am J Gastroenterol. 2002; 97: 241–8. ³ Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ). Наказ МОЗ України від 13.06.2005 № 271. ⁴ Bertrand J. Rev Med Tours. 1976; 10: 1265–70. ⁵ Faaij RA et al., Alim Pharm Ther. 1999; 13: 1605–10. ⁶ Fortran JS et al., N Engl J Med. 1966; 274: 921–7. ⁷ Johnson F et al., Scand J Gastroenterol. 2003; 38: 347–53. ⁸ Інструкція для медичного застосування препарату Маалокс® № 20. Наказ МОЗ України № 149 від 26.02.2014. Р.П. № UA/1076/03/01 від 01.03.2011. ⁹ Інструкція для медичного застосування препарату Езомеалокс. Наказ МОЗ України № 483 від 10.07.2014. Р.П. № UA/13167/01/01, № UA/13167/01/02 від 09.08.2013.

Езомеалокс. Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування пептичної виразки та гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби. Інгібітори протонної помпи. Код АТС A02B C05. Показання. Гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба. У комбінації з антибактеріальними засобами для ерадикації *Helicobacter pylori*. Лікування та профілактика виразок, спричинених тривалим застосуванням нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). Продовження лікування після внутрішньовенної терапії для профілактики повторної кровотечі з пептичної виразки. Лікування синдрому Золлінгера–Еллісона. Протипоказання. Відома підвищена чутливість до езомепразолу, до замінених бензimidазолів або до інших компонентів препарату. Езомепразол не слід застосовувати разом з атазанавіром, нелфінавіром. Дитячий вік до 12 років. Побічні реакції. Лейкопенія, тромбоцитопенія; агранулоцитоз, панцитопенія. Реакції гіперчутливості, наприклад, підвищення температури тіла, ангіоневротичний набряк та анафілактична реакція/шок. Периферичний набряк; гіпонатріємія; гіпомagneмія; важка гіпомagneмія, що може корелювати з гіпокальціємією. Безсоння; збудження, сплутаність свідомості, депресія; агресія, галюцинації. Головний біль; слабкість, парестезія, сонливість; порушення смаку. Нечіткість зору. Запаморочення. Бронхоспазм. Біль в животі, запор, діарея, метеоризм, нудота/блювання; сухість в роті; стоматит, шлунково-кишковий кандидоз. Підвищений рівень печінкових ферментів; гепатит з жовтяницею або без неї; печінкова недостатність, енцефалопатія у пацієнтів з раніше існуючим захворюванням печінки. Дерматит, свербіж, висипання, кропив'янка; алопеція, фоточутливість; мультиформна еритема, синдром Стивенса–Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (ТЕН). Артралгія, м'язова слабкість. Інтерстиціальний нефрит. Гінекомастія. Загальне нездужання, підвищена пітливість. Відпускається за рецептом лікаря.

Маалокс® — реклама лікарського засобу для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики. Езомеалокс — інформація про лікарський засіб для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики.

ТОВ «Санofi-Авентіс Україна». Київ, 01033, вул. Жиланська, 48–50а, тел.: +38 (044) 354 20 00, факс: +38 (044) 354 20 01. www.sanofi.ua SAUA.MAA.15.09.0263

Развиваем практические навыки Успешного Врача

ЯЗЫК ВЫГОД ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ВРАЧА

Очень часто пациенты не запоминают названий препаратов – как рецептурных, так и безрецептурных, – которые им выписывают или рекомендуют врачи, особенно в тех случаях, если пациенту не доведены основные выгоды от приема этого лекарства, а его название не было разборчиво произнесено или записано в рецепте. Именно это является одной из основных причин, по которой пациент либо не покупает выписанный/назначенный препарат, либо в аптеке сотрудники заменяют его на подобный препарат или вообще отменяют.

Эффективным методом борьбы с данной проблемой является выполнение врачом правильной презентации «Препарат–Характеристика–Выгода» пациенту на базе развития навыка «Язык выгод для Пациента и Врача».

Этот навык успешного врача заключается в понимании преимуществ **ХАРАКТЕРИСТИК** препаратов перед другими аналогами и умении на их базе формулировать **ВЫГОДЫ** для пациента в лечении того или иного заболевания.

Процесс назначения лекарственной терапии часто проходит в конце визита и важно понимать, что запоминается лучше (эпизод из известного фильма о Штирлице)

последняя фраза. Для повышения эффективности назначения этот, казалось бы, простой процесс разбивается на несколько этапов:

- ❖ **1-й этап** – врачу при назначении лечения важно четко и разборчиво произнести **НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА**,
- ❖ **2-й этап** – коротко и понятно объяснить **ХАРАКТЕРИСТИКИ** (свойства) препарата на понятном пациенту языке с избеганием сложных медицинских терминов и слэнга,
- ❖ **3-й этап** – затем обязательно использовать **СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ФРАЗУ** (-ы)
 - *Что позволит Вам...*
 - *Что даст Вам возможность...*
 - *Это означает для Вас...*
- ❖ **4-й этап** – представить конкретную и понятную **ВЫГОДУ** для конкретного пациента, записав разборчиво название конкретного препарата на бланке с указанием кратности и длительности приема препарата.

Доктор определился с диагнозом и выбрал для долгосрочной терапии у пациента с ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) современный препарат с доказанной эффективностью, содержащий эзомепразол

1 1-й этап – Название препарата – **ЭЗОМЕАЛОКС**

2 2-й этап – Основные **ХАРАКТЕРИСТИКИ** препарата, важные для пациента:

• Препарат применяется для долгосрочного лечения основного симптома – изжоги.

Важно! Старайтесь избегать терминов «кислотозависимые состояния», «процессы в слизистой/подслизистой», сокращения ГЭРБ, поскольку пациент по-разному может трактовать ваши слова и термины.

- Препарат выпускается в виде капсул, которые следует проглотить целиком. Если не получается проглотить, то можно растворить в 100 мл воды.
- Для лечения обычно используется 1 капсула в сутки.
- Препарат производится одним из лидеров фармацевтического рынка.

3 3-й этап – **СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФРАЗА** – Прием такого Препарата даст Вам возможность...

4 4-й этап – **ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫГОДЫ** (не более 2-3 – чем больше выгод, тем больше сомнений):

1. На протяжении менее 1 месяца одновременно лечиться и проводить профилактику рецидивов болезни, что позволит Вам избежать хирургического вмешательства при негативном развитии болезни.

Выгоды для пациента в таком сообщении:

- 1) Преимущество «два – в одном» – лечение и профилактика одновременно.
- 2) Прием не четыре недели, что кажется долгим периодом, а менее одного месяца – создается ощущение того, что это не так долго.

2. Принимать всего лишь по 1 капсуле в сутки для проведения доказательного лечения, а форму приема капсулы выбирайте сами – глотать или растворять в воде.

Выгоды для пациента:

- 1) Всего лишь по 1 капсуле в сутки.
- 2) Создается ощущение альтернативы приема для пациента – или так, или иначе – то есть пациент тоже активно участвует в процессе лечения.

3. Не переживайте о качестве препарата – он выпускается надежным производителем мирового уровня.

Эта выгода для тех пациентов, которые сомневаются в качестве препаратов. При такой формулировке часто отпадает вопрос о стоимости лекарственного средства, поскольку сочетание высокого качества и низкой стоимости – это редкость.

5 **ВАЖНО!** Перед расставанием с пациентом вручите ему бланк с написанным названием препарата, кратностью и длительностью лечения и, глядя в глаза пациенту, проинформируйте его о том, что Вы лично не гарантируете ему избавление от симптомов, если он не купит назначенный препарат или выписанный препарат будет заменен в аптеке.

Таким образом Вы даете понять пациенту, что настроены на лечение серьезно и ожидаете такого же поведения от него.

Выше мы рассмотрели выгоды для пациента.

Но также важно понимать выгоды и для врача при применении Эзомеалокса.

На поверхности лежат следующие выгоды:

- 1) Однократный прием препарата позволяет предположить высокий комплаенс (приверженность) у пациентов в отношении лечения.
- 2) Доказаны эффективность и безопасность приема препарата как у взрослых, так и у детей старше 12 лет. То есть доктору не нужно переживать о побочных эффектах и проведении контроля лабораторных показателей у пациента.
- 3) При положительной динамике пациенты всегда благодарны доктору, который «спас» их как от острой симптоматики, в данном случае – от постоянно мучающей изжоги, так и от проблемы эстетического характера – неприятного запаха изо рта.

И в конце – ВАЖНЫЙ совет от Успешного Доктора.

Не забудьте в конкретном случае позвонить Вашему пациенту как минимум 2 раза:

1-й раз – через 2-3 дня после визита – с целью уточнить, принимает ли он прописанное лечение, как его переносит и какие у него ощущения.

2-й раз – через 3 недели от начала терапии – с целью назначить повторную консультацию для этого пациента по истечении 28 дней лечения.

Успехов Вам, – докторам, – и правильных Вам пациентов!