Алгоритм лечения пациентов, у которых отсутствует ответ на терапию с применением ингибиторов ФНО

Рис. Алгоритм лечения пациентов, у которых отсутствует ответ на терапию с применением ингибиторов ФНО

Таблица. Терапевтический алгоритм, основанный на концентрации лекарственного средства в сыворотке крови

Контроль заболевания				
Сывороточный уровень	Оптимальный		Приемлемый	Неадекватный
	Высокое	Снижение дозы	Без изменения дозы ¹	Перевод
	Целевой диапазон	Без изменения дозы	Рассмотреть целесообразность увеличения дозы ^{1,2}	
	Низкое	Без изменения дозы ³	Увеличение дозы ²	

¹ Следует рассмотреть целесообразность другого медикаментозного или немедикаментозного вмешательства.

² Доза может быть увеличена, если максимальная утвержденная доза еще не достигнута, в этом случае следует учитывать переносимость лекарственного средства.

³ Необходима коррекция режима дозирования, для повышения остаточной концентрации до уровня, превышающего порог иммуногенности.

RA – ревматоидный артрит; ингибиторы ФНО – ингибиторы фактора некроза опухоли.

ФНО-рецептор с молекулярной массой 75 kD и Fc-фрагмент иммуноглобулина I человека.

Одним из путей предупреждения низкого ответа на терапию биологическими препаратами является применение метотрексата: в ходе исследований показана более высокая частота достижения клинического результата у пациентов, принимающих комбинированное лечение, и данный эффект метотрексата является дозозависимым.

В настоящее время разработаны алгоритмы действий при отсутствии ответа на терапию биологическими агентами, основанные на оценке концентрации действующего вещества в крови и наличия антител к препарату (рис., табл.).

Следует помнить, что длительность приема биологического препарата и удовлетворенность пациентов результатами терапии во многом зависят от его профиля безопасности и переносимости. Согласно данным Кокрановского мета-анализа в большинстве случаев биологические препараты демонстрируют сопоставимый профиль безопасности, тем не менее, для этанерцепта характерен меньший риск отмены терапии вследствие возникновения нежелательных явлений (Singh et al., 2009).

Важный вопрос, который всегда беспокоит ревматологов, назначающих своим пациентам биологическую терапию, – повышение риска возникновения инфекционных и опухолевых заболеваний. Следует отметить, что анализ данных относительно всех случаев выявления онкологических заболеваний у пациентов, принимавших биологические препараты, не показал достоверного увеличения риска их развития на фоне терапии ингибиторами ФНО (J. Asking et al., 2011). Исключением является рак

кожи, риск развития которого повышается при использовании всех биологических агентов.

Что касается риска реактивации туберкулеза, то результаты регистров RATIO и BSRBR свидетельствуют о том, что наиболее низкая частота развития этого осложнения наблюдается при применении этанерцепта по сравнению с использованием других ингибиторов ФНО – адалимумаба и инфликсимаба.

Таким образом, в реальной клинической практике мы можем влиять на различные риски, связанные с применением биологических препаратов, путем правильного выбора препарата (с учетом данных анамнеза пациентов), контроля показателей эффективности терапии и использования комбинированных схем лечения.

Важным моментом при проведении биологической терапии с применением ингибиторов ФНО является тщательный терапевтический мониторинг эффективности лекарственного средства (не реже, чем каждые 3 месяца). Результаты мониторинга позволяют вовремя выявить отсутствие или недостаточную первичную эффективность терапии, нежелательные реакции на препараты, вторичную утрату терапевтического ответа. Методы терапевтического мониторинга эффективности биологических препаратов в клинической практике должны быть усовершенствованы с учетом данных исследований, касающихся взаимосвязи концентрация-ответ.

Подготовила **Наталья Очеретяная**

Статья напечатана при поддержке Представительства «Файзер Эйч. Си. Пи. Корпорейшн» в Украине.

WUKENB0316030

Ревматология • Дайджест

Как мотивировать пациентов с ревматоидным артритом бросить курить?

Курение является значимым фактором риска развития ревматоидного артрита (РА). Отказ от этой пагубной привычки – необходимое условие успешного ведения пациентов. Но большинство курильщиков очень болезненно переносят расставание с сигаретой. Интересный опыт борьбы с курением у пациентов с РА недавно опубликовали шотландские исследователи. Они разработали специальные мотивационные материалы (памятки, плакаты) на основании результатов предварительного опроса пациентов, целью которого было оценить индивидуальные представления о вреде курения для здоровья. В группе, включившей 320 амбулаторных пациентов с подтвержденным диагнозом сероположительного РА, проводился телефонный опрос, в ходе которого оценивался статус курения и опыт отказа от курения, если таковой был. Оказалось, что многие бывшие курильщики с РА отказались от этой привычки, когда у них развилось одно из заболеваний, которое в общественном сознании имеет сильную ассоциацию с курением, например, эмфизема легких. Эта особенность была использована при разработке иллюстрированных материалов, которые демонстрируют, что РА – это заболевание с такой же сильной связью с курением. Впоследствии эти материалы были использованы в кампании по борьбе с курением в г. Fife (Шотландия), которая стартовала в 2011 г. Опрос, проведенный по завершении кампании среди 380 пациентов, выявил повышение обеспокоенности по поводу связи курения с РА на 21%, а по поводу негативного влияния курения на результаты терапии РА – на 45%. 75 из 380 пациентов бросили курить в период проведения кампании. По результатам опроса, на решение 13 из них повлияли новые мотивационные материалы, разработанные с учетом предыдущего опыта экс-курильщиков с РА. Таким образом, мотивация на отказ от курения, проводимая с учетом доминирующих в сознании пациента опасений по поводу влияния курения на здоровье, может быть эффективной стратегией борьбы с этой вредной привычкой. Вместе с тем небольшое количество пациентов, бросивших курить согласно данным исследования (75 из 380), еще раз подтверждает, насколько трудно преодолеть физическую зависимость от никотина, даже при хорошо спланированной и наглядной мотивационной работе.

Harris H.E. et al. J. Rheumatol. 2016 Feb 15. pii: jrheum.141368.

Скрытое поражение суставов у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) имеют множество внекишечных проявлений, самым частым из которых считается поражение суставов. Международной группой авторов (Италия, Португалия, Мексика) было проведено многоцентровое исследование распространенности субклинического поражения мышечно-скелетных структур у пациентов с ВЗК по данным ультрасонографии. На базе трех ревматологических центров в исследовании включили 76 пациентов с ВЗК, 20 больных спондилоартритом и 45 здоровых добровольцев в качестве контрольной группы. Все пациенты были тщательно обследованы на предмет наличия мышечно-скелетных симптомов опытным ревматологом, который не был в курсе диагноза. Ультразвуковое исследование (УЗИ) конечностей выполнялось в обычном серошкальном и в доплеровском режиме для поиска скрытой патологии суставов или энтезисов. Врачи, проводившие УЗИ, также были ослеплены относительно диагнозов. Из 76 пациентов с ВЗК у 64 (84,1%) было обнаружено поражение хотя бы одного энтезиса по данным серошкального УЗИ, а у 11 (13,9%) при проведении доплерографии выявлялись энтезиты более одной локализации. Чаще всего обнаруживались поражения сухожилия надколенника и четырехглавой мышцы бедра. У 32 пациентов (42,1%) было выявлено субклиническое поражение суставов, чаще всего коленного. У пациентов с ВЗК обнаруживалось достоверно большее количество вовлеченных энтезисов и суставов по сравнению с контрольной группой ($p < 0,001$), но результаты УЗИ в группах ВЗК и спондилоартрита достоверно не различались, как и между подгруппами пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом. Из лабораторных маркеров ВЗК только обнаружение перинуклеарных антинейтрофильных антител у пациентов достоверно ассоциировалось с субклиническим энтезитом.

Roivisco J BMC Musculoskelet Disord. 2016 Feb 16; 17(1): 84.

У пациентов с ревматоидным артритом следует учитывать повышенный риск развития сахарного диабета

Ревматоидный артрит характеризуется множественными коморбидными связями, в частности пациенты с этим диагнозом имеют на 50% повышенный сердечно-сосудистый риск относительно общей популяции. Одним из основных факторов кардиоваскулярного риска является сахарный диабет (СД). Итальянские исследователи изучали распространенность недиагностированного СД и преддиабета среди пациентов с РА. В исследование включили 100 больных с подтвержденным диагнозом РА, у которых измеряли уровень гликемии натощак, определяли липидный профиль крови и проводили тесты на толерантность к глюкозе. Результаты сопоставили с данными, полученными в контрольной группе, которую набрали из пациентов с невоспалительными заболеваниями (остеоартрит и фибромиалгия). В результате между группами РА и контроля достоверно не различались показатели распространенности гипергликемии натощак (9 из 100 против 12 из 100; $p = 0,49$), нарушенной толерантности к глюкозе (19 из 100 против 12 из 100; $p = 0,17$), а также обоих видов нарушений, характерных для преддиабета (5 из 100 против 9 из 100; $p = 0,27$). Вместе с тем распространенность показателей гликемии, соответствующих критериям диагноза СД, была достоверно выше среди пациентов с РА (10 из 100 против 2 из 100; $p = 0,02$). По результатам логистического регрессионного анализа, вероятность обнаружения преддиабета или СД 2 типа у пациентов с РА повышается по мере увеличения возраста и длительности заболевания. Стаж РА более 33 месяцев почти в 2 раза увеличивал вероятность обнаружения СД 2 типа. Авторы исследования заключили, что диагноз РА ассоциируется с повышенным риском развития СД, вероятность обнаружения которого особенно высока у пациентов с длительным анамнезом ревматического заболевания.

Ursini F et al. Medicine (Baltimore). 2016 Feb; 95(7): e2552.

Подготовил **Дмитрий Молчанов**