

ПанГастро

ПАНТОПРАЗОЛ

NEW

**Європейський пантопразол
за українською ціною!**



1. <http://compendium.com.ua/prices> роздрібна ціна станом на грудень 2015

ПанГастро: РП UA/13512/01/01, UA/13512/01/02 та UA/14142/01/01.

Препарати мають протипоказання для медичного застосування та можуть викликати побічні реакції. Для ознайомлення див. повну інструкцію до медичного застосування препаратів.

Для більш детальної інформації щодо препарату, а також для повідомлення про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу звертайтеся до представника заявника за адресою або телефоном:

вул. Амосова 12, м. Київ, 03680, тел. +380 (44) 495-28-66.

www.sandoz.ua

Категорія відпуску. За рецептом.

Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров'я.

3-09-ПАН-РЕЦ-0316



SANDOZ
a Novartis company

Современные подходы к антисекреторной терапии кислотозависимых заболеваний: в фокусе пантопразол

К кислотозависимым заболеваниям (КЗЗ) относят функциональные и органические нарушения, ассоциированные с агрессией желудочного сока. Причинами этих состояний могут быть дисбаланс между механизмами кислотопродукции и кислотонейтрализации, недостаточность кардиального или пилорического сфинктеров, нерациональное питание и злоупотребление алкоголем. Коррекция кислотообразования в желудке играет важнейшую роль в лечении многих заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и должна проводиться с применением современных препаратов, обладающих максимальной эффективностью и безопасностью.

КЗЗ — актуальная проблема современной медицины

Спектр КЗЗ довольно широк и включает гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), функциональную диспепсию, хронический гастрит и дуоденит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), эрозивно-язвенные поражения желудка и ДПК на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) либо ассоциированные с гиперпаратиреозом, синдром Золлингера-Эллисона, хронический панкреатит и др. КЗЗ лидируют по распространенности среди нарушений пищеварения и являются одной из наиболее частых причин обращения за медицинской помощью. Эти заболевания существенно снижают качество жизни больного и наносят значительный социально-экономический ущерб, сопоставимый с таковым при сердечно-сосудистой и онкологической патологии (Маев И.В., Андреев Д.В. и соавт., 2013).

КЗЗ в цифрах

- Симптомы ГЭРБ отмечаются у 40-50% населения.
- У 45-80% лиц с ГЭРБ обнаруживается эзофагит, у 10-35% имеют место признаки тяжелого эзофагита, у 7-23% — стриктуры пищевода и кровотечения.
- 78% респондентов с изжогой никогда не обращались к врачу.
- Проявления желудочной диспепсии отмечают 30-35% взрослых. Приблизительно у трети из них обнаруживаются функциональные нарушения.
- Язвенная болезнь выявляется у 5-14% взрослой популяции.
- Частота эрозивно-язвенных поражений, возникающих при приеме НПВП, варьирует от 20 до 40%.
- Прием НПВП повышает риск развития эрозивно-язвенных поражений в 3-5 раз, кровотечений и перфораций — в 8 раз.

Преимущества пантопразола в сравнении с другими антисекреторными средствами

Одной из наиболее эффективных и безопасных молекул для патогенетического лечения КЗЗ является ингибитор протонной помпы (ИПП) пантопразол. Он обладает высокой (77%) биодоступностью, благодаря чему оказывает выраженное антисекреторное действие уже после первого приема (Антоненко О.М., 2009). Препарату свойственна предсказуемая линейная фармакокинетика: при удвоении дозы пантопразола концентрация в сыворотке крови не выходит за рамки ожидаемой (рис. 1). Фармакокинетические исследования при пероральном приеме (10-80 мг) пантопразола и его внутривенном

введении (240 мг) также показали, что содержание препарата в сыворотке крови имело линейный характер.

Среди других ИПП только пантопразол специфически связывается с участком, включающим пятый и шестой трансмембранные сегменты α -субъединицы протонной помпы, а также с цистеином 822, который располагается глубоко в ее транспортном домене (Яковенко Э.П., 2012). Это обеспечивает более продолжительное действие молекулы по сравнению с таковыми других ИПП. При этом период полувыведения препарата не коррелирует с длительностью антисекреторного



Средневзвешенная розничная стоимость ПАНГАСТРО в Украине по состоянию на февраль 2016 г. *

эффекта: после прекращения приема пантопразола желудочная секреция в полной мере восстанавливается только спустя 46 ч (Шульпекова Ю.О., 2011).

Благоприятный профиль фармакокинетики препарата обеспечивает его высокую клиническую эффективность, доказанную в ряде исследований с участием разных категорий пациентов с КЗЗ.

Применение пантопразола для купирования изжоги у больных КЗЗ

В работе Scholten и соавт. применение пантопразола в дозе 20 мг или эзомепразола в дозе 20 мг в режиме по требованию оказалось равноэффективным в качестве длительного поддерживающего лечения неэрозивной ГЭРБ и эзофагита стадий А-В по Лос-Анджелесской классификации (рис. 2). Однако на фоне приема пантопразола выраженность изжоги была меньше (Шульпекова Ю.О., 2011).

В другом исследовании у пациентов с ГЭРБ и расстройствами сна (симптомы рефлюкса в положении на спине и в утренние часы, трудность засыпания, прерывистый сон) на фоне лечения пантопразолом в 75% случаев существенно улучшалось качество сна; у подавляющего большинства участников исчезли симптомы рефлюкса, в том числе изжога в ночное время (Шульпекова Ю.О., 2011).



Рис. 1

В испытании, проведенном Ткаченко Е.И., Пахомовой И.Г. и соавт. (2008), уменьшение выраженности изжоги уже на 3-й день отмечалось у 64,7% пациентов с ГЭРБ, получавших в качестве антисекреторной терапии пантопразол. К 5-мудню лечения изжога была купирована у 88,2% больных, через 2 нед терапии данный симптом не регистрировался ни у одного из участников исследуемой группы.

Пантопразол в профилактике и лечении гастропатии у пациентов, принимающих НПВП

В исследовании (n=800) изучалась эффективность пантопразола в контроле симптомов при приеме НПВП и оценивалось влияние различных факторов, таких как пол, возраст, употребление алкоголя, курение, инфекция *Helicobacter pylori*, на результат лечения. Пантопразол назначался в дозе 20 мг/сут, длительность терапии составляла 4 нед. Выраженность диспепсических симптомов была существенно ниже у пациентов, получавших пантопразол. При этом эффект препарата достигал максимума через 7 дней лечения независимо от влияния основных факторов риска (Шульпекова Ю.О., 2011).

По данным Н. Heinze и соавт., использование пантопразола для лечения пациентов с язвенной болезнью в течение ≥ 10 лет не сопровождалось ее рецидивами и существенными побочными реакциями, что полностью соответствует требованиям, предъявляемым к препарату для профилактики и лечения НПВП-гастропатий (Логинов А.Ф., 2011).

Лечение КЗЗ пантопразолом при наличии коморбидной патологии

В ряде исследований показано, что пантопразол не взаимодействует с антацидами, феназоном, кофеином, оральными контрацептивами, этанолом, глибенкламидом, левотироксином, метопрололом, пироксикамом, теофиллином, амоксициллином, кларитромицином, диклофенаком, напроксеном,

Продолжение на стр. 8.



Рис. 2

* <http://compendium.com.ua/prices>

Современные подходы к антисекреторной терапии кислотозависимых заболеваний: в фокусе пантопразол

Продолжение. Начало на стр. 3.

диазепамом, карбамазепином, дигоксином, нифедипином, циклоспорином, такролимусом и др. (рис. 3). Это позволяет использовать его в лечении и профилактике эрозивно-язвенных поражений желудка и ДПК у пациентов, получающих одновременно несколько препаратов (Яковенко Э.П., Яковенко А.П. и соавт., 2012).

Одной из острых проблем применения ИПП у лиц пожилого возраста с коморбидной патологией является снижение действия клопидогреля на фоне приема ИПП. В проспективном рандомизированном исследовании В. Lai и соавт. (2012) с участием здоровых волонтеров пантопразол назначали в дозе 80 мг в комбинации с клопидогрелем 600 мг в качестве однократной нагрузочной дозы, а затем по 75 мг/сут. Пантопразол, используемый в высоких дозах, не изменял фармакодинамические эффекты клопидогреля.

В рандомизированное перекрестное исследование R. Fontes-Carvalho и соавт. (2010) были включены 34 пациента, перенесшие за месяц до начала наблюдения острый инфаркт миокарда. Больные получали 40 мг омепразола или пантопразола в течение 1 мес, затем ИПП назначались в перекрестном дизайне. В ходе наблюдения отмечалось значительное снижение действия клопидогреля на фоне приема омепразола, однако при совместном использовании с пантопразолом эффективность клопидогреля сохранялась. Эти данные позволяют рекомендовать пантопразол в качестве препарата выбора для лечения КЗЗ у пациентов с коморбидной патологией.

ПАНГАСТРО		Минимум лекарственных взаимодействий				1,2,3	
ПАНТОПРАЗОЛ		Взаимодействие современных ИПП с другими препаратами					
	Эзомепразол	Лансопразол	Рабепразол	Омепразол	ПАНГАСТРО		
Антациды	-	★	○	○	○	○	
Карбамазепин	-	-	-	○	○	○	
Контрацептивы	-	★	-	○	○	○	
Диазепам	○	○	○	○	○	○	
Диклофенак	-	-	-	○	○	○	
Дигоксин	-	-	○	○	○	○	
Этанол	-	○	-	-	○	○	
Глибенкламид	-	-	-	-	○	○	
Левотироксин	-	-	-	-	○	○	
Метопролол	-	-	-	○	○	○	
Нифедипин	-	-	-	○	○	○	
Фенитон	○	○	○	○	○	○	
Пироксикам	-	-	-	○	○	○	
Теофиллин	-	★	○	○	○	○	
Варфарин	○	○	○	○	○	○	

Рис. 3. 1. Blume H., Donath F., Warnke A., Schug B.S. Pharmacokinetic drug interaction profiles of proton pump inhibitors // Drug Safety. 2006. Vol. 29 (9), p. 769-784. 2. Инструкция для медичного застосування лікарського засобу. 3. Chahin N.J., Moli M., Zaca F., Gilbertini P. Can J Gastroenterol 2006; 20, Suppl. A: 112.

Индивидуальный подход к выбору антисекреторного препарата

При назначении антисекреторного препарата важно учитывать не только фармакокинетические свойства молекулы. Препарат выбора должен отличаться высоким качеством, иметь удобную лекарственную форму и широкий спектр дозировок, а также доступную цену. На украинском рынке представлен препарат пантопразола ПАНГАСТРО («Сандоз Фармасьютикалз д.д., Словения»), который отвечает всем предъявляемым требованиям.

ПАНГАСТРО выпускается в двух лекарственных формах: гастрорезистентные таблетки по 20 мг и 40 мг № 14 и № 28; порошок для раствора для инъекций по 40 мг во флаконе № 1, № 5. Препарат изготавливается в соответствии с европейскими стандартами и признан в ЕС и США, при этом цена лекарственного средства доступна для украинского покупателя.

ООО «Сандоз Украина» – социально ответственная компания, поэтому ее ценовые предложения на продукты сопоставимы со стоимостью отечественных препаратов.

Это особенно важно при подборе лечения для пациентов с коморбидной патологией, которые вынуждены постоянно принимать несколько лекарственных препаратов. К примеру, пациент с сопутствующей ишемической болезнью сердца, согласно современным рекомендациям, получает минимум 4 медикамента: ацетилсалициловую кислоту, β-блокатор, статин, диуретик. Если к этой схеме необходимо добавить ИПП, возникает риск нежелательных лекарственных взаимодействий, а стоимость лечения возрастает. Терапия препаратом ПАНГАСТРО обеспечивает пациентам с КЗЗ высокий уровень эффективности при минимальном риске межлекарственных реакций. При этом больной получает лечение европейским пантопразолом по украинской цене.

Таким образом, пантопразол отличается от других антисекреторных препаратов более длительным подавлением желудочной секреции, минимальным риском лекарственных взаимодействий и предсказуемой линейной фармакокинетикой. Отечественным гастроэнтерологам, терапевтам и семейным врачам хорошо известен препарат ПАНГАСТРО, который обладает высокой клинической эффективностью и надежным профилем безопасности, а также имеет приемлемую для украинских пациентов стоимость. Препарат ПАНГАСТРО признан в странах Европы и в США, соответствует европейским требованиям к качеству препаратов. ПАНГАСТРО – европейский пантопразол по украинской цене.

Подготовила Мария Маковецкая

3-11-ПАН-РЕЦ-0316

ПЕРЕДПЛАТА НА 2016 РІК!

Здоров'я України

МЕДИЧНА ГАЗЕТА Шановні читачі!

Передплатити наші видання Ви можете в будь-якому поштовому відділенні зв'язку «Укрпошти» чи в редакції Видавничого дому «Здоров'я України».

Для редакційної передплати на видання необхідно:

- перерахувати на наш розрахунковий рахунок необхідну суму в будь-якому відділенні банку.
- При оплаті в призначенні платежу вказати обране видання та термін передплати;
- надіслати копію квитанції, яка підтверджує факт оплати визначеної кількості примірників;
- повідомити адресу доставки у зручний для Вас спосіб: тел./факс відділу передплати: +380 (44) 364-40-28; поштою: Видавничий дім «Здоров'я України», 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2, електронною поштою: podpiska@health-ua.com

«Медична газета «Здоров'я України XXI сторіччя»

Нове в медицині та медичній практиці. Передплатний індекс – 35272

Періодичність виходу – 2 рази на місяць / 24 рази на рік

Вартість редакційної передплати:

- на 3 місяці – 210 грн;
- на 6 місяців – 420 грн;
- на 12 місяців – 840 грн.

НАШІ РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «Медична газета «Здоров'я України 21 сторіччя»
03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2.
ЄДРПОУ 38419790, р/р 26007052613634 в ФКВ «Приватбанк»,
Розрахунковий центр м. Києва, МФО 320649,
Свідоцтво платника єдиного податку: Серія А № 612706



www.health-ua.com

Тематичні номери

«Медична газета «Здоров'я України».

Тематичний номер «Акушерство, гінекологія, репродуктологія»

Передплатний індекс – 89326

Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на рік – 200 грн, на півріччя – 100 грн

«Медична газета «Здоров'я України».

Тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія»

Передплатний індекс – 37635

Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на рік – 200 грн, на півріччя – 100 грн

«Медична газета «Здоров'я України».

Тематичний номер «Діабетологія, тиреоїдологія, метаболічні розлади»

Передплатний індекс – 37632

Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на рік – 200 грн, на півріччя – 100 грн

«Медична газета «Здоров'я України».

Тематичний номер «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»

Передплатний індекс – 37639

Періодичність виходу – 6 разів на рік
Вартість передплати на рік – 300 грн, на півріччя – 150 грн

«Медична газета «Здоров'я України».

Тематичний номер «Неврологія, психіатрія, психотерапія»

Передплатний індекс – 37633

Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на рік – 200 грн, на півріччя – 100 грн

НАШІ РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «Тематичний проект «Здоров'я України 21 сторіччя»
03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2.
ЄДРПОУ 38419785, р/р 26000052613363 ФКВ «Приватбанк»,
Розрахунковий центр м. Києва, МФО 320649,
Свідоцтво платника єдиного податку: Серія А № 612707

«Медична газета «Здоров'я України».

Тематичний номер «Онкологія, гематологія, хіміотерапія»

Передплатний індекс – 37634

Періодичність виходу – 5 разів на рік
Вартість передплати на рік – 250 грн

«Медична газета «Здоров'я України».

Тематичний номер «Педіатрія»

Передплатний індекс – 37638

Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на рік – 200 грн, на півріччя – 100 грн

«Медична газета «Здоров'я України».

Тематичний номер «Пульмонологія, алергологія, риноларингологія»

Передплатний індекс – 37631

Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на рік – 200 грн, на півріччя – 100 грн

«Медична газета «Здоров'я України».

Тематичний номер «Хірургія, ортопедія, травматологія»

Передплатний індекс – 49561

Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на рік – 200 грн, на півріччя – 100 грн

«Медична газета «Здоров'я України».

Тематичний номер «Урологія, нефрологія, андрологія»

Передплатний індекс – 86683

Періодичність виходу – 3 рази на рік
Вартість передплати на рік – 150 грн

Журнал «Серцева недостатність»

Передплатний індекс – 49291

Періодичність виходу – 3 рази на рік
Вартість передплати на рік – 150 грн

НАША АДРЕСА: Видавничий дім «Здоров'я України», 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2
Відділ передплати: (044) 364-40-28, e-mail: podpiska@health-ua.com