

# НАЙЗИЛАТ

АМТОЛМЕТИН ГУАЦИЛ 600 МГ № 10


## Особливий НПЗЗ:


амтолметин  
допомагає  
усунути біль,  
захищає шлунок\*



**Показання:**  
больовий та запальний синдром при  
остеоартриті, ревматоїдному артриті<sup>1</sup>

**Найзилат – НПЗП  
з гастропротективним  
ефектом<sup>1</sup>**

до  Приймати  
натщесерце  
(до їди)<sup>1</sup>

 По 1 таблетці  
1-2 раза на добу<sup>1</sup>

1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Найзилат. Доступ за посиланням: [http://www.drz.com.ua/ibp/lz\\_www.nsf/id/39399565ECBE8C8C22585DD0040B63E/\\$file/UA121590101\\_3DA2.mht](http://www.drz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/39399565ECBE8C8C22585DD0040B63E/$file/UA121590101_3DA2.mht).

НПЗП – нестероїдний протизапальний препарат.

\*мається на увазі поєднання полегшення суглобового болю внаслідок дії амтолметину гуацилу з можливістю реалізації гастропротективної властивості. НПЗЗ – нестероїдний протизапальний засіб.

**Склад:** 1 таблетка містить амтолметину гуацилу 600 мг. Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні лікарські засоби. Код АТХ М01А. Фармакологічні властивості. Амтолметин гуацил – нестероїдний протизапальний засіб (НПЗЗ) із протизапальним, знеболювальним та жарознижувальним ефектом, що зумовлено пригніченням синтезу простагландинів за рахунок неселективного інгібування ензиму циклооксигенази (ЦОГ), але, на відміну від традиційних НПЗЗ, за рахунок своєї структури забезпечує гастропротекторний, антисекреторний, антиоксидантний ефекти. **Показання.** Больовий та запальний синдром при захворюваннях опорно-рухового апарату: при остеоартриті, ревматоїдному артриті; при посттравматичному болю. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до амтолметину, толметину; повне або неповне поєднання бронхіальної астми, рецидивуючого поліпозу носа або навколоносових пазух і непереносимості ацетилсаліцилової кислоти та інших нестероїдних протизапальних препаратів; ерозивно-виразкові зміни слизової оболонки шлунка і 12-палої кишки, активна шлунково-кишкова кровотеча; цереброваскулярні або інша кровотеча. Діти – протипоказано. **Спосіб застосування та дози.** Застосовувати внутрішньо натщесерце. Рекомендована доза препарату дорослим – по 1 таблетці 1-2 рази на добу. **Побічні реакції.** З боку травної системи: завдяки гастропротекторним властивостям амтолметину гуацилу застосування препарату забезпечує мінімальний ризик проявів побічних реакцій у шлунково-кишковому тракті; рідко поширені – нудота, блювання, діарея, диспепсія, абдомінальний біль. Категорія відпуску. За рецептом. РСЛЗ № UA/12159/01/01 Наказ МОЗУ № 543 від 19.05.2017 р.

За додатковою інформацією звертайтеся за адресою: ТОВ «Др.Редді'с Лабораторіз», Столичне шосе, 103, оф. 11-А, м. Київ, Україна, 03131, тел. +380444923173.

Інформація про лікарський засіб призначена для медичних та фармацевтичних працівників. Перед призначенням ознайомтеся з повним текстом інструкції до медичного застосування.